



راهنمای آموزشی بیماران
دفترچه پیگیری درمان
با وارفارین و گزارش PT

۱۱۹



زیر نظر:

دکتر فروغ آزادی

متخصص داخلی

تهیه کننده:

دفتر پرستاری

دپارتمان آموزش بیمار



مشخصات دارنده دفترچه

نام و نام خانوادگی بیمار:

تشخیص بیماری قلبی:

PT مورد نظر:

INP مورد نظر:

بیمار گرمی / همراه عزیز:

با سلام و آرزوی سلامتی همیشگی برای شما

اکنون که ضرورت دارد شما تحت درمان مداوم با داروی وارفارین قرار گیرید، لازم است اطلاعات کافی از مصرف و عوارض آن داشته باشید. این دارو ضد انعقاد خوراکی می‌باشد و از تشکیل و گسترش لخته در داخل عروق یا روی درپچه‌های مصنوعی قلب جلوگیری می‌کند. وارفارین فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K را مهار می‌کند و مصرف مداوم آن جنبه حیاتی دارد. این دارو بخوبی از مجرای گوارش جذب شده، در کبد متابولیزه می‌شود و از راه ادرار و صفرا دفع می‌گردد. قرص‌های آن بصورت ۵ میلی گرمی و به رنگ صورتی در داروخانه‌ها موجود است. مقدار لازم دارو در بیماران مختلف متفاوت است و بر حسب نتایج آزمایش های PT، PTT، خون، مصرف سایر داروها و رژیم غذایی توسط پزشک تعیین می‌گردد. این دفترچه حاوی جدول نتایج آزمایش و میزان داروی تجویز شده شما در هر ویزیت است، لذا هر زمان که به دکتر مراجعه می‌کنید آنرا همراه داشته باشید.

در مصرف وارفارین به نکات زیر به دقت توجه و عمل نمایید:

- آزمایش PT را در تاریخ معین و به طور مرتب انجام دهید. فواصل انجام این آزمایش معمولاً هر ۴-۳ هفته یک بار است. ممکن است در شروع مصرف دارو، آزمایشات در فواصل کوتاهتری تکرار شود تا به INR مورد نظر برسیم. بهتر است وارفارین بعد از ظهرها و در ساعت مشخص مصرف شود.
- آزمایش خون باید در تاریخی که پزشک برای شما مشخص می‌کند انجام گیرد. این زمان را به هیچ عنوان به علت فشار کاری و یا هر مشکل دیگر به عقب نیندازید.
- همیشه مقدار کمی دارو در منزل داشته باشید تا در صورت اتمام دارو و تا زمان خرید بعدی، وقفه ای در مصرف آن ایجاد نشود.
- برای هر ماه یک برگ تقویم ماهیانه داشته باشید. هر روز سر ساعت معین دارو را مصرف و در تقویم علامت بگذارید تا در طول روز شک به خوردن یا نخوردن آن نکنید.
- دارو را با معده‌ی خالی مصرف کنید تا بهتر جذب شود.
- دارو را در قوطی که از کارخانه آمده نگهداری کنید. درب آن را پس از مصرف بخوبی ببندید و دور از نور، رطوبت و گرما نگه دارید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- خودسرانه میزان داروی خود را کم، زیاد و یا قطع نکنید.
- میزان داروی خود را با میزان وارفارین سایر بیماران مقایسه نکنید.
- میزان دارویی که برای شما تجویز شده را به بیماران دیگر توصیه نکنید.
- آزمایشات دوره‌ای ادرار و مدفوع را از نظر وجود خون و تست‌های کبدی که معمولاً هر شش ماه یک بار درخواست می‌شود را در تاریخ معین انجام دهید.



- بهترین زمان برای نمونه گیری خون ۱۲ تا ۱۸ ساعت پس از مصرف آخرین نوبت دارویی است.
- بیماران سالمند، بیماران با مشکلات روانی، افراد معتاد به الکل، بیماران با داروهای مصرفی دیگر مانند آسپرین (ASA)، پلاویکس (Plavix) و مسکن‌ها نیاز به کنترل دقیق‌تری دارند.
- در صورت بروز کبودی، خونمردگی خودبخودی زیر پوست، خونریزی، وجود خون در ادرار، مدفوع قرمز یا روشن و قیری سیاه رنگ، خونریزی از لثه، خونریزی از بینی و خونریزی زیاد دوره قاعدگی موارد را به پزشک اطلاع دهید.
- در صورتیکه در طول یک روز فراموش کردید داروی خود را مصرف کنید، به محض متوجه شدن در همان روز آن را مصرف نمایید، ولی اگر چنانچه فردا به خاطر آوردید هرگز میزان دارو را دوبرابر نکنید بلکه اول یک آزمایش PT بدهید و جواب آن را به پزشک اطلاع دهید؛ هر دستوری که داده شد آن را اجرا کنید.
- به هر دلیل که نزد پزشک یا دندان‌پزشک مراجعه می‌کنید، یادآوری کنید در حال مصرف وارفارین هستید و این دفترچه را به ایشان نشان دهید.
- تب، پیدایش بیماری خاص، تغییر در رژیم غذایی و هر اتفاق مهم و جدیدی که الگوی زندگی شما را از حالت قبل تغییر داده است را، به اطلاع پزشک معالج خود برسانید.
- بعضی از مواد غذایی، سرشار از ویتامین K بوده که منجر به تغییرات اثرات وارفارین و به دنبال آن تغییر در PT خواهد شد، لذا از مصرف بی‌رویه آنها خوداری کنید. این ویتامین به وفور در سبزیجات برگ‌دار سبز یافت می‌شود. از جمله منابع غنی این ویتامین می‌توان به کلم بروکلی، کلم، کاهو و اسفناج اشاره نمود، که در برگ این گیاهان بیش از ۱۰۰ میکروگرم ویتامین K به ازاء هر صدگرم وجود دارد. ویتامین K موجود در لبنیات، گوشت و تخم مرغ بین ۱ تا ۵۰ میکروگرم به ازاء هر گرم است. این ویتامین در برابر حرارت مقاوم بوده و در صورت پخت معمولی، تخریب نمی‌شود.

هشدار به خانم‌های سنین بارداری:

- جهت جلوگیری از بارداری تا حد امکان از IUD استفاده نکنید.
- مصرف وارفارین در دوران بارداری به دلیل اثرات سوء دارو و خطرات مهم برای مادر ممنوع است.
- در صورت حاملگی ناخواسته، حتماً به پزشک اطلاع دهید تا در مورد ادامه و یا تعویض داروی شما تصمیم بگیرد.

دپارتمان آموزش بیماران
دفتر پرستاری





راهنمای آموزشی بیماران / دفترچه پیگیری درمان
با وارفارین و گزارش PT

تمام حقوق مادی و معنوی این کتاب برای مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا محفوظ است.

ناشر: انتشارات میرماه (۲-۱-۲۲۷۲۲۹۰) گرافیک: مهدیه ناظم زاده

تهیه کننده: **لینوگرافی و چاپ:** قائم چاپ جوریند

دفتر پرستاری/دیپارتمان آموزش بیماران **صحافی:** عطف

زیرنظر: دکتر فروغ آزادی **قیمت:** ۱۵۰۰۰ ریال

نوبت و سال انتشار: اول/۱۳۹۷ **شابک:** ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴-۶۳-۹

شمارگان: ۲۰۰۰ جلد

عنوان و نام پدیدآور : دفترچه پیگیری درمان با وارفارین و گزارش PT از برنظر فروغ آزادی؛ تهیه کننده دفتر پرستاری، دیپارتمان آموزش بیمار؛ آیه سفارش؛ بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا، (ص)، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا.

مشخصات نشر : تهران: میرماه، ۱۳۹۱.

مشخصات ظاهری : ۱۶ ص: مصور (رنگی)

فروست : بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا، (ص)، ۱۱۹.

شابک : ۱۵۰۰۰ ریال: ۹-۶۳-۶۰۰-۶۰۴-۶۰۰-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

یادداشت : بالای عنوان: راهنمای آموزشی بیماران.

عنوان دیگر : راهنمای آموزشی بیماران.

موضوع : داروهای قلبی

موضوع : قلب - بیماری‌ها - درمان

موضوع : داروها - عوارض جانبی

موضوع : وارفارین

شناسه افزوده : آزادی، فروغ، ۱۳۲۵ -، ناظر

شناسه افزوده : بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیا، (ص) دفتر

شناسه افزوده : پرستاری دیپارتمان آموزش بیماران

شناسه افزوده : بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیا، (ص)

شناسه افزوده : مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

رده بندی کنگره : RM ۳۴۵/۷۱۳۹۱

رده بندی دیویی : ۶۱۵/۷۱

شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۰۸۴۱۶



მეცნიერება

